

ANEXO II

Calendário de Vacinação para crianças (maiores de sete anos) e adolescentes¹ - 2011

INTERVALO ENTRE AS DOSES	VACINA	ESQUEMA
PRIMEIRA VISITA	BCG ² HEPATITE B dT POLIOMIELITE (ORAL) ² SARAMPO-CAXUMBA-RUBÉOLA	DOSE ÚNICA PRIMEIRA DOSE PRIMEIRA DOSE PRIMEIRA DOSE PRIMEIRA DOSE
2 MESES APÓS A PRIMEIRA VISITA	HEPATITE B dT POLIOMIELITE (ORAL) ² SARAMPO-CAXUMBA-RUBÉOLA FEBRE AMARELA ³	SEGUNDA DOSE SEGUNDA DOSE SEGUNDA DOSE SEGUNDA DOSE DOSE INICIAL
4 MESES APÓS A PRIMEIRA VISITA	HEPATITE B ⁴ dT POLIOMIELITE (ORAL) ²	TERCEIRA DOSE TERCEIRA DOSE TERCEIRA DOSE
A CADA 10 ANOS	dT ⁵ FEBRE AMARELA ³	REFORÇO

¹ adolescência – período entre 10 e 19 anos de idade (OMS, SBP). Caso a pessoa apresente documentação com esquema de vacinação incompleto, é suficiente completar o esquema já iniciado. Ressalte-se que a adolescência é o período apropriado para a verificação e complementação de esquemas vacinais iniciados na infância.

² As vacinas BCG e oral contra a poliomielite são indicadas, prioritariamente, para pessoas com até 15 anos de idade.

³ Para pessoas que residem ou viajam para regiões onde houver indicação, de acordo com a situação epidemiológica.

⁴ O intervalo mínimo entre a segunda e a terceira dose é de dois meses desde que o intervalo de tempo decorrido entre a primeira e terceira dose seja, no mínimo, de quatro meses.

⁵ Em caso de gravidez e na profilaxia do tétano após alguns tipos de ferimento, deve-se reduzir este intervalo para cinco anos.

De acordo com a RDC ANVISA nº61/2008:

BCG: vacina contra a tuberculose

POLIOMIELITE: vacina poliomielite 1, 2 e 3 (atenuada)

HEPATITE B: vacina hepatite B (recombinante)

SARAMPO-CAXUMBA-RUBÉOLA: vacina sarampo, caxumba, rubéola

FEBRE AMARELA: vacina febre amarela (atenuada)

dT: vacina adsorvida difteria e tétano adulto